

DIMENSIONALE AUSWERTUNG

Name Kind: _____ Datum: _____ Indextrauma - Ereignis(e): _____

Auswertung für PTBS Symptomschwere (DSM-5)

Summe der Items #1 bis #20. Verwenden Sie bei den Fragen #9, #10 und #15 nur den höchsten Wert.

DSM-5 PTBS Summenwert = _____

| | | | |
|--|--|---|--|
| CATS 7-17 Years Score <15 Normal. Nicht klinisch auffällig. | CATS 7-17 Years Score 15-20 Moderate traumabezogene Stresssymptomatik. | CATS 7-17 Years Score ≥ 21* Erhöhte Stresssymptomatik. Positives Screening. * | CATS 7-17 Years Score ≥ 25* Hohe traumabezogene Stresssymptomatik. Wahrscheinliche PTBS. * |
|--|--|---|--|

*Validierungsstudie: Sachser et al., 2022

Auswertung für PTBS Symptomschwere (ICD-11)

Summe der Items #2, #3, #6, #7, #17, #18.

ICD-11 PTBS Summenwert = _____

| | | | |
|---|--|--|---|
| CATS 7-17 Years Score <5 Normal. Nicht klinisch auffällig. | CATS 7-17 Years Score 5-6 Moderate traumabezogene Stresssymptomatik. | CATS 7-17 Years Score ≥ 7* Erhöhte Stresssymptomatik. Positives Screening. * | CATS 7-17 Years Score ≥ 9* Hohe traumabezogene Stresssymptomatik. Wahrscheinliche PTBS. * |
|---|--|--|---|

*Validierungsstudie: Sachser et al., 2022

Auswertung für KPTBS Symptomschwere (ICD-11)

Summe der Items #2, #3, #6, #7, #9b, #9d, #10a, #13, #14, #15a, #17, #18.

ICD-11 KPTBS Summenwert = _____

| | | | |
|--|---|---|---|
| CATS 7-17 Years Score <9* Normal. Nicht klinisch auffällig. * | CATS 7-17 Years Score 10-12* Moderate traumabezogene Stresssymptomatik. * | CATS 7-17 Years Score ≥ 13* Erhöhte Stresssymptomatik. Positives Screening. * | CATS 7-17 Years Score ≥ 16* Hohe traumabezogene Stresssymptomatik. Wahrscheinliche kPTBS. * |
|--|---|---|---|

* klinische Approximation, Cut-off Validierung ausstehend

KATEGORIALE AUSWERTUNG

Name Kind: _____ Datum: _____ Indextrauma - Ereignis(e): _____

DSM-5 PTBS

| DSM-5 Kriterien: | # der Symptome (nur Items mit Bewertung von 2 oder 3 zählen) | # Erforderliche Symptome | DSM-5 Kriterium erfüllt? | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Wiedererleben Items 1-5 | | 1+ | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Vermeidung Items 6-7 | | 1+ | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Negative Stimmung/Gedanken Items 8-14 (highest of #9, #10 and #15) | | 2+ | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Hyperarousal Items 15-20 | | 2+ | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Funktionelle Beeinträchtigung Fragen 1-5 Ja/Nein Fragen | | 1+ | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Wahrscheinliche DSM-5 PTBS Diagnose* | | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

ICD-11 PTBS und KPTBS

| ICD-11 Kriterien: | # der Symptome (nur Items mit Bewertung 2 oder 3 zählen) | # Erforderliche Symptome | ICD-11 Kriterium erfüllt? | |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Wiedererleben Items 2, 3 | | 1+ | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Vermeidung Items 6, 7 | | 1+ | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Hyperarousal Items 17, 18 | | 1+ | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Funktionelle Beeinträchtigung Fragen 1-5 Ja/Nein Fragen | | 1+ | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Wahrscheinliche ICD-11 PTBS Diagnose* | | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

| kPTBs Kriterien (nur wenn ICD-11 PTBS erfüllt ist!): | | | | |
|--|--|----|-----------------------------|-------------------------------|
| Affektdysregulation Items 14, 15a | | 1+ | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Negatives Selbstkonzept Items 9d, 10a | | 1+ | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Störungen in Beziehungen Items 9b, 13 | | 1+ | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Wahrscheinliche ICD-11 kPTBS Diagnose* | | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

*CATS-2 ist ein Screening-Instrument. Auffällige Werte können eine trauma-fokussierte Behandlung anzeigen. Da es sich jedoch um eine Selbstauskunft handelt sollten Kliniker den CATS-2 nicht alleine als diagnostisches Tool nutzen.